

Hubungan antara intimasi pasangan dengan kepatuhan pengobatan antiretroviral (ARV) pada orang dengan HIV-AIDS di Kota Bandung = Relationship between spousal intimacy and antiretroviral therapy (ART) adherence among people living with HIV-AIDS in Bandung / Safitri Fadilla Wardhani

Safitri Fadilla Wardhani, author

Deskripsi Lengkap: <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20493995&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Antiretroviral (ARV) terbukti efektif untuk menurunkan angka kematian akibat HIV-AIDS. Namun demikian efektifitas ARV sangat dipengaruhi oleh kepatuhan Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) dalam mengkonsumsi ARV. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan ODHA terhadap pengobatan ARV adalah intimasi pasangan sebagai bentuk dukungan psikososial bagi ODHA yang terbangun dari aspek emosional, sosial dan seksual. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan antara intimasi pasangan dengan kepatuhan pengobatan ARV. Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional* pada 115 responden ODHA dewasa yang mendapat pengobatan ARV, sampel diperoleh dengan teknik *consecutive sampling*. Hasil analisis uji *Chi Square* menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara intimasi pasangan dengan kepatuhan pengobatan ARV (*p value* = 0,000; 95% CI). ODHA yang memiliki tingkat intimasi tinggi, memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula. Dari hasil penelitian ini perawat dan konselor dapat melibatkan pasangan ODHA dalam memotivasi, mengawasi dan mengingatkan ODHA untuk patuh terhadap pengobatan

ARV.

**Kata Kunci:** ARV, intimasi pasangan, kepatuhan

---

**ABSTRACT**

Antiretroviral therapy has been proven effectively in reducing mortality caused by HIV-AIDS. However, the effectiveness of antiretroviral therapy is affected by adherence. The factor that influences Antiretroviral adherence is spousal intimacy as a psychosocial support that built on emotional, social and sexual aspects. The research aimed to identify the relationship between spousal intimacy with Antiretroviral adherence. This research used a cross sectional design with a consecutive sampling method involving 115 adult People Living With HIV-AIDS (PLWHA) who received Antiretroviral as respondents. The results of the research was analyzed by Chi Square test and showed a significant relationship between spousal intimacy with Antiretroviral adherence (*p value* = 0,000; 95% CI). PLWHA who have a high level of intimacy also have a high level of Antiretroviral adherence. This research is beneficial for the health provider in supporting the improvement of ART adherence by involving PLWHA partners in care, support and treatment

programs.

**Keywords:** Adherence, antiretroviral, spousal Intimacy.